HPV-vaccinstudien Skåne

FAQ

INTERNT – TILL BARNMORSKOR OCH ANNAN BERÖRD HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSPERSONAL

Om studien

- **Var kan jag läsa mer om studien?**

Mer information om studien hittar du på www.hpvcenter.se

Frågor som rör kvinnorna

- **Vart/till vem kan jag hänvisa kvinnans eventuella frågor om studien?**

För att läsa mer om HPV-vaccination och att boka tid kan du hänvisa till **1177.se/hpv-vaccination**. Om kvinnan har frågor om studien kan hon mejla till **hpvcenter@ki.se**

- **Kan kvinnor i åldersgruppen födda 1994 – 99 som bor i andra regioner kunna boka tid för vaccination i Skåne?**

Ja, även kvinnor i målgruppen som bor i andra regioner ska erbjudas deltagande i studien om de hör av sig.

Alla regioner i Sverige är med i studien. Centralt har man beslutat att samtliga regioner ska erbjuda vaccination till de kvinnor från andra regioner som hör av sig om studien. Uppföljande HPV-provtagning sker genom att kvinnan i samband med vaccinationen lämnar vaginalt HPV-prov på barnmorskemottagningen som hanteras av Region Skåne, eller uppmanas att beställa ett egenprovtagningskit för HPV via **www.hpvcenter.se** (Karolinska HPV Self Sampling (**kiehealth.se**).

Då får hon egenprovtagningskit och svarskuvert till sin hemadress. Region Skåne alternativt Region Stockholm skickar sedan ut resultatet till kvinnans hemregion.

- **Ska kvinnor från andra regioner som får en första vaccination i Skåne få andra vaccinationen i sin hemregion?**

Ja, de kommer att kallas i sin hemregion via studien.

- **Vad gör jag om kvinnan redan har lämnat in ett egenprov för HPV, dvs innan hon vaccineras?**

Barnmorskan ger kvinnan ett nytt egenprov för HPV att ta efter vaccinationen. Barnmorskan ger också instruktioner om hur provet ska skickas in. Alternativt skickas provet in från mottagningen till lab.

- **Vilka kvinnor bör inte delta i studien?**

Kvinnor bör inte vaccineras med Gardasil 9 om de:

- tidigare reagerat kraftigt vid HPV-vaccination med Gardasil 9, Gardasil, Silgard
- har fått en tidigare svår allergisk reaktion som föranlett sjukhusvård
- är gravid
- har hög feber vid vaccinationstillfället

Om kvinnan har något av följande, kan hon eventuellt erbjudas vaccination efter diskussion med läkare:

- har blödningssjukdom eller tar blodförtunnande medel
- har ett försvagat immunförsvar

- **Kan kvinnan vaccineras mot covid och HPV samtidigt?**

Ja, det går bra, enligt Folkhälsomyndigheten.

- **Många av kvinnorna som kommer till BMM vet inte om de är vaccinerade eller ej. Hur ställer vi oss till det?**

Det gör inget - alla får samma vaccindos och samma HPV-screening oavsett tidigare vaccinationer.

- **Kan kvinnor som tex. är asylsökande, papperslösa och liknande vaccinera sig inom ramen för studien?**

Ja, det går bra.

Om vaccinet, antal doser, läkemedelshantering, kylar etc

- **Vad gäller vid hantering av vaccinet?**

Se läkemedelsrutin.

- **Vilka biverkningar finns det?**

Mycket vanliga (fler än 10 % av vaccinerade): smärta, svullnad och rodnad vid injektionsstället samt huvudvärk.

Vanliga biverkningar (upp till 10 % av vaccinerade): blåmärke och klåda vid injektionsstället, samt feber, trötthet, yrsel och illamående.

Allergiska reaktioner är sällsynta. Symtom kan vara andningssvårigheter, väsande andning, nässelutslag och/eller hudutslag samt svimning. Mer information om biverkningar finns på www.fass.se.

Om kvinnan mår bra minuterna direkt efter vaccinationen kan hon lämna mottagningen och behöver inte stanna kvar för observation.

- **Räcker två doser med tre års intervall? I FASS står det ”Individer som är 15 år och äldre vid det första injektionstillfället - Gardasil 9 ska ges enligt ett tredosschema (0, 2, 6 månader)”.**

Ja. Studien har fått tillstånd att prova om två doser ger tillräckligt skydd. Texten i FASS ändras inte förrän resultatet av studien är klart.

- **Erbjuder vi Gardasil 9 till alla kvinnor, även de som tidigare vaccinerats med Gardasil 4 (4-valenta vaccinet)?**

Ja. Andelen vaccinerade med Gardasil 4 är för låg för att kunna nå befolkningsimmunitet. Det är bättre att ha ett skydd mot alla 9 HPV-typerna. Det har visats att det är säkert att vaccinera med Gardasil 9 efter tidigare Gardasil 4-vaccination.

Registrering och dokumentation

- **Hur gör jag om inte CTS fungerar av någon anledning tex internetproblem?**

Läs och skriv gärna ut instruktionen på studiens hemsida i förväg: **www.hpvcenter.se**

Du kan vända dig till help@hpvelimination.se.

Vid akuta fall kan du kontakta projektledaren vid Karolinska Institutet på telefonnummer:

+46 7 00917250

- **Hur registrerar jag kvinnan som ska vaccineras i CTS om hon inte har Mobilt Bank-ID?**

Det fungerar att registrera sig både med och utan Mobilt Bank-ID.

- **Hur ska QR-koden till hälsodeklarationen användas?**

Kvinnan scannar QR-koden med hjälp av sin mobiltelefonkamera. Då kommer hon till en webbsida där hon kan fylla i hälsodeklarationen digitalt. Om kvinnan inte har tillgång till en mobiltelefon kan hälsodeklarationen fyllas i direkt i CTS.

- **Behöver jag skriva ut några dokument och ha på BMM inför mötet med kvinnan?**

Ja, det är bra att ha både hälsodeklaration och samtycke utskrivna med tanke på eventuella internetproblem. Om dessa fylls i av kvinnor ska de sparas i en pärm och skickas till:

Department of Laboratory Medicine
Sara Arroyo Mühr F56
Karolinska University Hospital
Huddinge 141 86
Huddinge, Sweden

Dokument skickas till projektansvariga vid Karolinska Institutet en gång i veckan. Innan dokumenten skickas ska de kopieras och sparas för eventuell kontroll. Se separat anvisning.