

Vanliga frågor och svar

Fråga: Varför erbjuds jag gratis vaccination mot HPV?

Svar: Erbjudandet är en del av en studie som undersöker om organiserad vaccination och provtagning kan utrota HPV och livmoderhalscancer, när tillräckligt många i befolkningen blir immuna. Det är samma vaccin och provtagning för HPV som redan används rutinmässigt.

Fråga: Kostar det något att delta?

Svar: Nej, det är gratis att delta. Vaccinet betalas av studien.

Fråga: Jag har tidigare tagit HPV-vaccin. Är det ändå meningsfullt att delta?

Svar: Före 2019 använde Sverige ett HPV-vaccin (Gardasil4) som skyddar mot 4 HPV-typer. Det numera använda vaccinet (Gardasil9) skyddar mot 9 HPV-typer och ger ett bredare skydd mot HPV och livmoderhalscancer. Det är visat att det är säkert att ta Gardasil9 ovanpå Gardasil4. Så välkommen att delta!

Fråga: Spelar det någon roll om man inte vet vilket Gardasil-vaccin som jag fått tidigare?

Svar: Nej, det spelar ingen roll.

Fråga: Jag har fått information om att jag har HPV eller cellförändringar. Kan jag ta vaccinet ändå?

Svar: Ja, det går bra. Vaccinet ger dig skydd mot HPV-typer som du inte har just nu, men tyvärr botar den inte befintlig infektion. Det är därför viktigt att du fortsätter gå på de undersökningar som du blir kallad till.

Fråga: Jag kan inte delta just nu. Hur långt fram i tiden är studien öppen för nya deltagare?

Svar: Erbjudandet om gratis vaccination finns fram till december 2024.

Fråga: Varför är det viktigt med HPV-prov i samband med vaccination och hur går det till?

Svar: Vaccinet ger ett gott skydd mot ny infektion med de 9 HPV-typer som finns i vaccinet, men skyddar inte om man redan råkat få infektion. För att inte inge falsk säkerhet är det därför viktigt att ta ett kompletterande HPV-prov. Provet tas som ett självprov efter vaccinationen.

Fråga: Mina jämnåriga vänner har inte fått någon inbjudan, kan de delta?

Svar: Ja, vi vänder oss nu till alla kvinnor födda 1994–1999.

Fråga: Varför ges bara en dos vaccin just nu och sedan andra dosen om 3 år?

Svar: Redan vid dos 1 finns en betydande effekt mot infektion. När andra dosen ges med ett större intervall om 3 år fås ett gott skydd mot HPV och då räcker doserna till alla. Om 3 år förväntas den globala bristen på HPV-vaccin vara över.

Fråga: Varför erbjuds enbart kvinnor födda 1994–1999 HPV-vaccination.

Svar: Äldre kvinnor har lägre risk för smitta.

Fråga: Varför erbjuds inte män HPV-vaccination?

Svar: Studien syftar till att utrota livmoderhalscancer genom samtidig vaccination och screening. För att kunna delta i studien måste deltagarna ha en livmoderhals.

Fråga: Hur kan jag vara positiv för HPV nu när jag lever i en fast relation?

Svar: De flesta HPV infektioner läker ut av sig själva inom något år, men ibland läker HPV-infektionen aldrig ut och man kan ha haft infektionen i många decennier. Om infektionen är långvarig finns risken att de infekterade cellerna utvecklas till cellförändringar som i sin tur kan leda till livmoderhalscancer. Utvecklingen till cancer tar minst 10 år, i snitt ca 20 år. Vaccination mot HPV kommer att skydda mot nya HPV infektioner. Med vaccination och cellprovtagning tillsammans finns förutsättningar att utrota denna cancer.

Fråga: Är det svårt att ta ett HPV-prov själv? Är det säkert?

Svar: Det är enkelt att ta ett HPV-prov själv och det är lika säkert som att ta provet hos en barnmorska. Med självprovet följer tydlig instruktion om hur provet ska tas. På 1177.se/kolla-hpv finns mer information om hur du gör för att ta självprov mot HPV.

Fråga: När får jag HPV-provet för självprovtagningen?

Svar: I samband med din HPV-vaccination får du material för självprovtagning. Du får välja om du vill ta provet på plats i samband med vaccinationen eller om du vill ta provet hemma. Du skickar då in provet i medföljande kuvert för analys.

Fråga: När och var kan jag ta del av mitt provsvar?

Svar: Provresultatet tar du del av genom att logga in med bank-id på <https://selfsampling.kiehealth.se/profile> cirka en månad efter att du skickat in ditt prov. Har du inte bank-id kommer du att få provsvar via brev.

Fråga: Kan jag ta HPV-provet om jag har mens?

Svar: Ja.

Fråga: Om jag nyligen tagit ett HPV-prov hemma eller hos barnmorska, behöver jag ändå ta ett nytt HPV-prov med anledning av deltagande i studien?

Svar: Alla får ett självprov i samband med vaccinationen. Det ska tas efter vaccinationen, även om man nyligen tagit ett självprov eller prov hos barnmorska.

Fråga: Jag har tagit ett HPV-prov efter vaccinationen och har nu fått ett nytt självprov eller blivit kallad till att boka tid för en cellprovtagning. Ska jag göra ännu en provtagning?

Svar: Ja det ska du. För det är den provtagningen du regelbundet kallas till från Region Jämtland Härjedalen. Den ersätts inte av HPV-provet i studien.

Fråga: Vad händer om mitt prov innehåller HPV?

Svar: Om provet innehåller HPV som behöver följas upp kommer du få en tid för cellprovtagning på en barnmorskemottagning efter 3-4 månader att du tagit självprov.

Fråga: Om provet innehåller HPV, behöver jag då smittspåras?

Svar: HPV smittspåras inte.

Fråga: Hur gör jag som äter blodförtunnande medicin, måste jag förbereda mig före vaccination?

Svar: Nej, du kan vaccinera dig ändå.

Fråga: Är alla vacciner "riktiga" vaccin eller kommer vissa få placebo?

Svar: Alla får riktigt vaccin.

Fråga: Hur fungerar det om jag flyttat till annan del av Sverige mellan dos 1 och dos 2? Hur får jag kallelse?

Svar: I första hand kommer kallelse via Kivra, om du inte har Kivra får du inbjudan per post till din folkbokföringsadress.

Fråga: Kan jag hjälpa till på något sätt?

Svar: Vi är väldigt tacksamma om alla hjälper till att sprida information om att vi nu har möjlighet att utrota HPV och livmoderhalscancer med vaccination och HPV-prov.

För mer information, gå in på: hpvcenter.se/deltagare

Har du frågor kring din vaccination kontakta:

Anna Ericsson, vaccinationssamordnare Region Jämtland Härjedalen
vaccinationsmottagningen.campus@regionjh.se